




**Wilhelm  
Kantner-Rumplmair**

**Höllische  
Fälle**

**Das  
post-  
operative  
Delir**

**Stefan  
Schmid**

*Cut, die erste...*



Klappe

# Drehbuch

- m (71a)
- Aortenklappeninsuffizienz
- bio AKE
- SIRS
- Weaning failure
- Encephalopathie
- Man in the barrel



# Filmmusik

intermittierend Midazolam und

Morphinhydrochlorid-Trihydrat

Vasopressoren (Noradrenalin, Vasopressin)

Hydrocortison

Insulin

CRRT

...

pTs

...

# Konsilium: Depressio ?

**FU u. MfG**  
**MR BEAN**  
**Therapievorschlag erbeten.**

# Filmanalyse



**Angehörige:** keine Depression in der Vorgeschichte, bis zur OP aktiver Lebensstil, „kennt uns manchmal nicht“

**Bezugspflegeperson:** angenehmer, pflegeleichter Patient, Vigilanz wechselt, nächtens manchmal etwas unruhig, lässt sich nicht adäquat mobilisieren („macht nicht mit“)

**Stefan:** Patient hämodynamisch stabil, keine KHK, keine Aortenstenose, CRP rückläufig, nach 2x Anticholinium® ohne Effekt, Ausschluss ZAS

# *de-lirare* (Lat.)

„aus der Furche geraten“

- ⊙ Bewusstsein und Aufmerksamkeit
- ⊙ Wahrnehmung
- ⊙ Denken
- ⊙ Gedächtnis
- ⊙ Psychomotorik
- ⊙ Emotionalität
- ⊙ Schlaf-Wach-Rhythmus

# de-lirare (Lat.)

## „aus der Furche geraten“

- 15-30%
- Beste Prognose
- Entzug
- Intoxikation
- Bei vorbestehender Demenz?

Hyperaktiv



- 40-50%
- Ungünstige Prognose

Gemischt



- 20-70%
- Metabolische Störungen
- Alter > 80
- Halluzinationen
- Ungünstige Prognose

Hypoaktiv





# Filmanalyse



Psychiatrische Diagnose:

hyporeaktives Delir

Therapie:

Analeptische Behandlung mit  
Methylphenidat (Ritalin®)


2,5 mg (5 mg) 1 – 1 - 0

Absetzen vor der Verlegung

# Methylphenidat (Ritalin®)

- Methylphenidat wirkt anregend und aufregend (psychoanaleptisch). Es unterdrückt Müdigkeit und Hemmungen und steigert kurzfristig die körperliche Leistungsfähigkeit. Normalerweise bei körperlicher Überlastung auftretende Warnsignale wie Schmerz und Erschöpfungsgefühl werden vermindert.(WIKIPEDIA)
- **CAVE CARDIO** (Indikation, Monitoring!)
- **SUCHT** (keine Weiterverschreibung)
- **SCHNELLER WIRKEINTRITT**
- **GUTE STEUERBARKEIT**

Cut, die zweite.....



# Drehbuch

m (19a)

Near Drowning

Polytrauma

CPR bei Asystolie

schwere Hypothermie

Hyperfibrinolyse

ARDS und vv-ECMO

Epiduralhämatom mit OP

akutes Nierenversagen

MODS

# Filmmusik

Midazolam, Sufentanil

Midazolam, Morphinhydrochlorid-Trihydrat

Adjuvant Clonidin in der Weaningphase (14d)

Propofol (Bolusgabe für Pflegemaßnahmen)

...

*Konsilium:* DD: - hypox. Enzephalopathie  
- organisch nach SHT



*„ich möchte sterben“*

# „ich möchte sterben“ Anamnese!

- ? Patient wurde unter einer Brücke  
aufgefunden
- ? Visitenkarte einer Drogenberatungsstelle
- ? Eltern sind wenig auskunftsfreudig
- ? „Der liebe Gott“ habe ihm aufgetragen zu  
springen

# Filmanalyse



## Psychiatrische Diagnose:

Z.n. Suicidversuch

i.R. eines komplexen Wahngeschehens,  
ausgelöst durch eine Drogenpsychose

## Therapie:

Neuroleptische Anbehandlung mit Aripiprazol  
(Abilify®)


vor der Verlegung Übergabe an den  
psychiatrischen Liaisondienst der  
Unfallstation



# Das Versicherungsproblem

- ⊙ Die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV)
  - Suizid und **Suizidversuche werden als Unfall anerkannt**, falls der Suizident oder die Suizidentin zum Zeitpunkt der Tat **vollständig urteilsunfähig** war (Art. 48 UVV; BGE 129 V 95).
- ⊙ Betriebsunterbrechungsversicherung 2014 WKO Wien
  - Abweichend zu den Allgemeinen Bedingungen für die Betriebsunterbrechungsversicherung für freiberuflich und selbständig Tätige sind Betriebsunterbrechungsfälle infolge psychischer und psychosomatischer Verstimmungen (unabhängig von der Verursachung) ..., bis hin zum **Selbstmord vom Versicherungsschutz ausgenommen**

# Wie würden Sie entscheiden?



**Suicidversuch dokumentieren:**

**JA oder NEIN**

# Weiter auf Schiene in der Geisterbahn

**DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT**

**Stefan Schmid & Wilhelm Kantner-Rumplmair**